FICHA TÉCNICA

+ALTITUD GOLD

FUNGICIDA



REGISTRO NACIONAL: 179-F3/NA-CL1

TITULAR: ROTAM ECUADOR S.A

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Azoxystrobin + Tebuconazole
Concentración	80 g/l + 160 g/l
Categoría toxicológica	II Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	**Azoxystrobin:** Estrobilurina **Tebuconazole:** Triazoles

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

ALTITUD GOLD Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento micelial, y también muestra actividad antiesporulante, se absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con la translocación principalmente acropetal.

MODO DE EMPLEO

Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **ALTITUD GOLD** en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardarla mezcla aplique en su totalidad el mismo día de su preparación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Rosas (*Rosa* sp)	Mildiu velloso (*Peronospora sparsa*)	1,25 mi/l	0 días
Maíz (*Zea mays*)	Tizón foliar del maíz (*Helminthosporium turcicum*)	0,75 l/ha	15 días
Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0,70 l/ha	35 días
Tomate hortícola (*Lycopersicon esculentum Miller*)	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	0,60 l/ha	7 días
Cacao (*Theobroma cacao*)	Moniliasis (*Moniliophthora roreri*)	0,60 l/ha	30 días

*Gasto de Agua: **Rosas 1000 l/ha, Maíz, Tomate y Cacao 400 l/ha, Arroz 200 l/ha** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Rosas: Aplicar el producto cuando exista una presencia del 2% de la plaga, esto por dos ocasiones, en las partes aéreas de la planta. Maíz: Aplicar entre fases vegetativa: etapa V10 (10 hojas expandidas) y Fase reproductiva R1 (50 % de inflorescencia). Aproximadamente entre 50 y 80 días después de la siembra, por dos ocasiones con intervalos de 7 días. Arroz: Realizar la primera aplicación en la época de embuchamiento y la segunda al 10% de floración del arroz. Tomate: Realizar hasta dos (2) aplicaciones por ciclo de cultivo al aparecimiento de los primeros síntomas. Cacao: Realizar una (1) aplicación en etapa de fructificación (mazorca) cuando el porcentaje de infección sea del 2 -5%.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico ala dosis y usos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con todos los productos de uso agrícola. No utilice en mezcla con productos de pH alcalino; pH >9.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com