FICHA TÉCNICA

# +BIOEZKUDO ALGAS




**REGISTRO NACIONAL:** F-2023-1463

**TITULAR:** DR. AGRO S.A.

| | |
|---|---|
| **Tipo de producto** | Bioestimulante |
| **Aplicación** | Foliar - Edáfica |

| COMPOSICIÓN | |
|---|---|
| MATERIA ORGÁNICA | 55 |
| *Ascophyllum nodosum* | 19.43 |
| Ácido alginico | 16 |
| Manitol | 3.43 |
| POTASIO ($K_2O$) | 16 |
| AMINOÁCIDOS LIBRES TOTALES | 0.400 |

## BENEFICIOS

**BIOEZKUDO ALGAS** aprovecha las propiedades de los extractos de Ascophyllum nodosum, una alga marina que es rica en sustancias bioactivas naturales beneficiosas para el crecimiento de las plantas. Estos extractos contienen elementos nutricionales minerales y oligoelementos absorbidos del mar por las propias algas.

La aplicación de estos extractos naturales de algas tiene impactos sumamente positivos en las plantas, como se detalla a continuación:

+ Estimulación del crecimiento de las raíces y del crecimiento vegetativo.
+ Fomento de un crecimiento más vigoroso.
+ Incremento de la resistencia de las plantas ante situaciones de estrés, como salinidad, heladas y sequías.
+ Mejora de la resistencia a plagas.
+ Optimización del intercambio entre la raíz y el suelo.
+ Fortalecimiento del sistema radicular.
+ Aumento del poder de ab sorción radicular y translocación de nutrientes.
+ Función potenciadora en el desarrollo de cultivos.
+ Aumento en la cantidad de frutos y mejora de su calidad.

Estas características hacen que los bioestimulantes basados en Ascophyllum nodosum sean altamente recomendados tanto para la aplicación foliar como para el fertirriego. Proporcionan a la planta un complemento ideal en diversas situaciones o etapas del cultivo, maximizando su rendimiento y salud general.

BIOESTIMULANTES

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com

FICHA TÉCNICA

# +BIOEZKUDO ALGAS

BIOESTIMULANTES

## USOS

| Cultivo | Dosis | Época de aplicación | Forma de aplicación |
|---|---|---|---|
| **Árboles frutales** | 2-5 kg/ha | Aplicar antes de la floración y repetir la aplicación 3-5 veces en temporada de crecimiento. | Foliar |
| **Arroz** (*Orysa sativa*) | 1-3 kg/ha | Aplíquelo en la siembra de brotes en la etapa de macollamiento, antesis y llenado. | |
| **Maíz** (*Zea mays*) | | | |
| **Flores** | | Aplíquelo un día antes del trasplante y luego aplíquelo cada 7-10 días. | Foliar y edáfica (fertirriego o drench) |
| **Papa** (*Solanum tuberosum*) | | Aplíquelo después del trasplante, luego aplíquelo cada 7-10 días desde la brotación hasta el período de fructificación. | |
| **Tomate riñón** (*Solanum lycopersicum*) | | | |
| **Banano** (*Musa acuminata* AAA) | | Aplíquelo desde la etapa de siembra hasta la etapa de brotación. | |
| **Cacao** (*Theaobroma cacao*) | | | |

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con pesticidas o herbicidas alcalinos fuertes

Dr. Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com