FERTILIZANTES FOLIARES

FICHA TÉCNICA

+BIOEZKUDO®



REGISTRO NACIONAL: 0474-F-AGR-G
TITULAR: DR. AGRO S.A. DORAGRO

Tipo de producto	Bioestimulante
Aplicación	Foliar
Composición	Potasio (K2O) 3,0% p/v
	Ácidos húmicos 6,0% p/v
	Ácidos fúlvicos 6,0% p/v
Presentaciónes	1L - 4L - 20L - 200L

MODO DE ACCIÓN

BIOEZKUDO® es un bioestimulante a base de potasio con ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que ayuda a evitar el stress y promueve una pronta recuperación de la planta. Aumenta la sanidad y desarrollo radicular.

MODO DE EMPLEO

Agítese bien antes abrir y usarlo. El equipo de aspersión debe estar limpio. Usar fijador o dispersante en la mezcla con **BIOEZKUDO®**. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de **BIOEZKUDO®** y luego el resto del agua, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo. Aplicar **BIOEZKUDO®** , después de riego o con el suelo húmedo. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Maíz (*Zea mays*)	1-3 L/ha	Fase de desarrollo vegetativo, de 4 a 8 hojas.	Aplicaciones foliares repetidas a intervalos de 10 a 14 días.
Arroz (*Oryza sativa*)	1,5 L/ha	Desde el comienzo hasta iniciación de panícula.	Aplicacion foliar.
Banano (*Musa acuminata* AAA)	2 L/ha	Durante el relleno de los racimos.	Aplicacion foliar. Repetir si fuese necesario en caso de moderadas a severas deficiencias en intervalos de 7 a 14 días.
Brócoli (*Brassica oleracea* var. *italica*)	3 L/ha	Cuando la planta tenga entre 4-6 hojas verdaderas.	Aplicacion foliar. Repetir si fuese necesario en caso de moderadas a severas deficiencias en intervalos de 7 a 14 días.
Cebolla (*Allium cepa*)	3 L/ha	Cuando las hojas tengan suficiente superficie para asimilar el spray.	Aplicacion foliar.
Papa (*Solanum tuberosum*)	2 L/ha	Durante el engorde (cuando los primeros tubérculos tengan 10 mm de diámetro)	Aplicaciones foliares con intervalos de 10 a 14 días entre las aplicaciones.
Pimiento (*Capsicum annuum*)	1-3 L/ha	Durante el engorde (cuando los primeros tubérculos tengan 10 mm de diámetro)	Aplicaciones foliares con intervalos de 10 a 14 días entre las aplicaciones.
Tomate (*Solanum lycopersicum*)	1 L/ha	En el cuajado del fruto en el primer racimo	Aplicaciones foliares a campo abierto con intervalos de 10 días

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

+ FICHA TÉCNICA

INCOMPATIBILIDAD

BIOEZKUDO® Es incompatible con agroquímicos altamente alcalinos de uso corriente, sin embargo, se recomienda hacer siempre una prueba de compatibilidad a escala antes de la aplicación".

ADVERTENCIA

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR. Usar ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla, etc. Antes de comer, beber o fumar, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón."No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos "No contamine fuentes de agua". "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin". "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o per forándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".

Dr.Agro
Montalvo, vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com