FICHA TÉCNICA

# BIOEZKUDO FULVIC POLVO




REGISTRO NACIONAL: F-2024-1952
TITULAR: DR. AGRO

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Bioestimulante |
| Aplicación | Foliar - Edáfica |

| ANALISIS GARANTIZADO | |
|---|---|
| Extracto húmico total | 80 % |
| Ácido fúlvico | 50% |
| Potasio | 12% |

## CARACTERÍSTICAS

Los ácidos fúlvicos estimulan el crecimiento de las plantas, aumentando su vigor, estimula la absorción y promueve la penetración y transporte activo de los nutrientes a nivel membrana fundamental de células foliares y radiculares, que actúa como promotor de crecimiento vegetal y agente quelatante.

## MODO DE ACCIÓN

Ejerce una singular actividad biocatalizadora que desencadena una serie de funciones importantes en el suelo, como también en la bioactivación de varios procesos metabólicos al interior de las plantas. Químicamente fijan los minerales y fertilizantes colocándolos disponibles, incrementando la absorción de quelatos de iones metálicos por el aumento de la C.I.C. Físicamente modifican la estructura y textura del suelo, incrementando la retención de humedad y su ventilación. Biológicamente, estimula el crecimiento de flora y fauna microbiológica nativa o inducida, generando así, biofertilización y mineralización de los elementos presentes en el suelo y produciendo naturalmente, auxinas, giberelinas y citoquininas. **BIOESKUDO FULVIC** es un producto natural no tóxico y amigable con el medio ambiente.

## BENEFICIOS

+Rico en esencia bioactiva extraída de la planta.
+Estimular la capacidad anti estrés, anti-enfermedad.
+Aumentar la capacidad de retención del suelo.
+Mejorar el vigor de la planta, al prevenir el envejecimiento prematuro y aumentar la actividad de las enzimas.

BIOESTIMULANTES

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com

FICHA TÉCNICA

# + BIOEZKUDO FULVIC POLVO

BIOESTIMULANTES

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

| CULTIVO | DOSIS | ÉPOCA DE APLICACIÓN | FORMA DE APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Árboles frutales | 2-5 kg/ha | Aplicar antes de la floración y repetir la aplicación 3-5 veces en temporada de crecimiento | Foliar |
| Arroz (*Oryza sativa*) | 1-3 kg/ha | Aplíquelo en la siembra de brotes en la etapa de macollamiento, antesis y llenado. | |
| Trigo (*Triticum aestivum* L.) | | | |
| Flores | | Aplíquelo un día antes del trasplante y luego aplíquelo cada 7-10 días. | Foliar y edáfica (fertirriego o drench) |
| Papa (*Solanum tuberosum*) | | Aplíquelo después del trasplante, luego aplíquelo cada 7-10 días desde la brotación hasta el período de fructificación. | |
| Tomate riñón (*Solanum lycopersicum*) | | | |
| Maíz (*Zea mays*) | | Aplíquelo desde la etapa de siembra hasta la etapa de brotación. | |

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con pesticidas o herbicidas alcalinos fuertes

Dr. Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com