FICHA TÉCNICA

+BOWLER

ACARICIDA



REGISTRO NACIONAL: **6-A18/NA**
TITULAR: COMERCIALIZADORA SAL ECUADOR SINO-AGRIEC S.A.

Tipo de producto	Acaricida Agrícola
Formulación	Concentrado Emusionable (EC)
Ingrediente activo	Abamectin
Concentración	18 g/l
Categoría toxicológica	II Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro, 100ml
Grupo químico	**Abamectin:** Avermectinas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

BOWLER es un insecticida y acaricida con acción de contacto y estomacal. Tiene limitada actividad sistémica en la planta, pero exhibe movimiento translaminar. Causa parálisis en organismos expuestos. Estimulan la liberación de ácido y-aminobutírico (GABA), que afecta a los canales C1 en el sistema nervioso central.

MODO DE EMPLEO

Aplicación foliar con un volumen de agua suficiente parra cubrir uniformemente el área foliar, utilizando una bomba manual de espalda.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Arroz (*Oryza sativa*)	**Ácaro de vaina** (*Steneotarsonemus spinki*)	0,3 l/ha	21 días

*Volumen de agua: **200 l/ha*** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **BOWLER** por una sola ocasión cuando se observe la presencia de ácaros.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar 24 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

No debe ser mezclado con químicos altamente reactivos como ácidos o bases fuertes, o agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com