INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

+BRUZLI® 50



REGISTRO NACIONAL: 49 - I25/NA

TITULAR: DR. AGRO S.A. DORAGRO

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Lambda-Cyhalothrin
Concentración	50.0 g/l
Categoría toxicológica	III MODERADAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Piretroide

MODO DE ACCIÓN

BRUZLI® 50 es un insecticida no sistémico con acción de contacto y estomacal, con propiedades repelentes. Es de rápido "knockdown" y posee larga actividad residual. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, alterando la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio.

MODO DE EMPLEO

Previo a calibración del equipo de aplicación, vierta en el tanque de mezcla la cantidad de **BRUZLI® 50** a utilizar en la mitad de volumen de agua a usar. Agregar a esta mezcla la cantidad de agua requerida para completar la suspensión a ser aplicada; agitar bien y constantemente, verter la mezcla en el tanque de aspersión. "No aplicar cuando está por llover ".

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC PERIODO DE CARENCIA
Maíz (*Zea mays*)	**Gusano cogollero** (*Spodoptera frugiperda*)	0,3 l/ha 1,5 ml/l*	21 días

PC= **Período de Carencia**; *Gasto de agua= **200 l/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar por una sola ocasión cuando el cultivo se encuentre en crecimiento longitudinal del tallo principal (estadio principal 3) aproximadamente 30 DDS (Después de la siembra).

PERIODO DE REINGRESO

24 horas. Si se requiere ingresar al cultivo antes de este período, utilice equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros productos agroquímicos, sin embargo se recomienda realizar una pequeña prueba previa de compatibilidad física.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com