INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

+BUMERAN®



REGISTRO NACIONAL: 26-I62/NA
TITULAR: DR. AGRO S.A. DORAGRO

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Chlorpyrifos
Concentración	480.0 g/l
Categoría toxicológica	3 Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Organofosforado

MODO DE ACCIÓN

BUMERAN® Es un insecticida no sistémico con acción de contacto, estomacal y respiratorio. Actúa como un inhibidor de la colinesterasa, generando permanentemente impulsos eléctricos produciendo convulsiones en el sistema muscular de la plaga.

MODO DE EMPLEO

Para la preparación de la mezcla, vierta en un tanque o recipiente la cantidad recomendada de **BUMERAN®** a utilizar en la mitad de volumen de agua a usar. Complete la cantidad de agua requerida y continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea; verter la mezcla en el tanque de aspersión.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC PERIODO DE CARENCIA
Maíz (*Zea mays*)	**Gusano cogollero** (*Spodoptera frugiperda*)	0,7 l/ha	22 días

***PC= Período de Carencia; Gasto de agua= 200 l/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar por una sola ocasión cuando el cultivo se encuentre en desarrollo, aproximadamente 30 días después de la siembra con un porcentaje máximo de 20% de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

72 horas. Si se requiere ingresar al cultivo antes de este período, utilice equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros productos agroquímicos, sin embargo se recomienda realizar una pequeña prueba previa de compatibilidad física.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com