FICHA TÉCNICA

MOLUSQUICIDA

+CARACOZELL

REGISTRO NACIONAL: 21-M10/NA
TITULAR: NIMELEC S.A.



Tipo de producto	Molusquicida Agrícola
Formulación	Cebo en Gránulos (GB)
Ingrediente activo	Metaldehyde
Concentración	60 g/kg
Categoría toxicológica	III Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 Kg, 400g
Grupo químico	Metaldehyde: Salicilanilidas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

CARACOZELL es un molusquicida, que actúa como veneno por contacto, inhalación y por ingestión. Envenena babosas produciendo que se segreguen grandes cantidades de baba (hasta el 40-50% de su peso corporal), de forma que se deshidratan y mueren. Un efecto secundario es la parálisis del sistema nervioso. Esto impide que se muevan y se refugien, por lo tanto, esto ayuda a la deshidratación por favorecer que estén en un lugar seco, soleado y/o ventoso.

MODO DE EMPLEO

No necesita preparación previa, está formulado para su uso inmediato. No requiere de equipo de aplicación. Se debe de procurar una buena cobertura de toda la superficie de la parcela.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
ARROZ (*Oryza sativa*)	**CARACOL MANZANA** (*Pomacea canaliculata*)	**3.0 kg/ha**	**No aplica**

*PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación, al observar los primeros ejemplares.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD

CARACOZELL no posee incompatibilidades.

Dr. Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com