HERBICIDAS

FICHA TÉCNICA

+CLIO 400®



REGISTRO NACIONAL: 90-H34/NA
TITULAR: ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

Tipo de producto	Herbicida agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Bispyribac-sodium
Concentración	400 g/l
Categoría toxicológica	III
Presentaciónes	100ml, 250ml, 500ml, 1 L
Grupo químico	Ácido Pirimidil Oxibenzoico

MODO DE ACCIÓN

CLIO 400® (Bispyribac-sodium 400 g/ SC) es un herbicida selectivo de acción sistémica que actua como un inhibitor de le acetolectato sintasa (ALS) necesaria para la biosintesis de los aminoácidos de cadena ramificada en las plantas. El resultado es que pocos días después de la aplicación la maleza afectada presenta una coloración azul posteriormente clorosis y disminución en el crecimento. Esto seguido por una necrosis y muerte en los tejidos vegetales.

MODO DE EMPLEO

Para la aplicación del producto, realizar la mezcla en un recipiente, agregar agua y regular el pH a 5,5. Añadir la dosis recomendada de **CLIO 400®** (Bispyribac-sodium 400 g/l SC), agitar hasta formar una suspensión homogénea, completar el volumen de agua a usar, finalmente colocar en la bomba y se aplicó usando el equipo completo de protección.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC PERIODO DE CARENCIA
ARROZ (*Oryza sativa*)	**LIENDRE DE PUERCO** (*Echinochloa colonum* L.) **PATA DE GALLINA** (*Eleusine indica*) **BLEDO** (*Amaranthus hybridus*) **GUARDA ROCÍO** (*Digitaria sanguinalis* L.)	0.40 l/ha	78 días

Volumen de agua: 250 L/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **CLIO 400®** a campo abierto de las malezas, en el cultivo de "Arroz"(*Oryza sativa*), cuando las malezas presenten con más de 3 hojas desarrolladas. Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en la maleza. No se recomienda hacer más de una aplicación por ciclo.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

CLIO 400® El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

CLIO 400® Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com