HERBICIDAS

FICHA TÉCNICA

+CLOMATRON® 48



REGISTRO NACIONAL:

TITULAR: DR. AGRO S.A. DORAGRO

Tipo de producto	Herbicida agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Clomazone
Concentración	480 g/l
Categoría toxicológica	4 LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Oxasolidinona

MODO DE ACCIÓN

CLOMATRON® 48 es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y brotes y traslocado hacia arriba. Las especies susceptibles emergen, pero carecen de pigmentación. Inhibe la biosíntesis de carotenoides; enzima diana no conocida.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, regular pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite dejar sobrantes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC PERIODO DE CARENCIA
Arroz (*Oryza sativa*)	**Paja de patillo** (*Echinochloa colonum*) **Coquito** (*Cyperus rotundus*) **Cabezonillo** (*Cyperus ferax*) **Clavo de agua** (*Jussiaea linifolia*)	1.25 l/ha	NO APLICA

Volumen de agua: 250 l/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se aplicará por 1 ocasión, en el cultivo de arroz antes de la siembra (preemergencia).

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 12 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com