FICHA TÉCNICA

+CONTROLADOR 760

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: 55-F9/NA

TITULAR: NGC CROPCIENCES ECUADOR



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Polvo Mojable (WP)
Ingrediente activo	Propineb + Cymoxanil
Concentración	700 + 60
Categoría toxicológica	4 LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1KG y 25KG
Grupo químico	Propineb:Ditiocarbamatos Cymoxanil: Acetamidas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

CONTROLADOR 760 es un fungicida compuesto por Propineb (Código FRAC M03), molécula con acción de contacto con propiedades protectoras y larga actividad residual con un mecanismo de acción multisitio y por Cymoxanil molécula con sitio objetivo desconocido (Código FRAC: 27) con actividad protectora y curativa.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del fungicida **CONTROLADOR 760** en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de preparación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el plaguicida con cuidado para evitar derrames desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua. Aplicar por aspersión a la planta dirigida al follaje, cubriendo de forma homogénea.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Papa (*Solanum tuberosum*)	**LANCHA TARDÍA** (*Phytophthora infestans*)	1.50 kg/ha*	7 días
Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*)	**LANCHA TARDÍA** (*Phytophthora infestans*)	1.50 kg/ha*	7 días

*Volumen de agua: Se considera un gasto de agua de 600 litros por hectárea. **Volumen de agua: Se considera un gasto de agua de 600 litros por hectárea.
PC: Período de carencia

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Papa: Realizar 2 aplicaciones con intervalos de 7 días en fase fenológica de formación de brotes laterales. Umbral económico de la plaga: Aplicar con los primeros síntomas (2-10% de infección) **Tomate riñón:** Realizar 2 aplicaciones con intervalos de 7 días en fase fenológica de formación de brotes laterales. Umbral económico de la plaga: 2% de ataque

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 24 horas para reingresar al área tratada

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

COMPATIBILIDAD

Puede mezclarse con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes existentes en el mercado, excepto aquellos de reacción fuertemente alcalina. En caso de duda, hacer una prueba a pequeña escala.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com