FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

+CYMODIN®

REGISTRO NACIONAL: 58-F26/NA
TITULAR: DUAJA DEL ECUADOR S.A.



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Polvo Mojable (WP)
Ingrediente activo	Mancozeb + Cymoxanil
Concentración	640 g/kg + 80 g/kg
Categoría toxicológica	3 LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1 Kg
Grupo químico	Mancozeb Ditiocarbamato Cymoxanil Ciano

MODO DE ACCIÓN

MANCOZEB: fungicida con acción protectiva
CYMOXANIL: fungicida foliar con acción protectiva y curativa

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de producto, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC*
Melón (*Cucumis melo*)	**Mildiu velloso** (*Pseudoperonospora cubensis*)	500 g/ha	14 días
Papa (*Solanum tuberosum*)	**Lancha** (*Phytophthora infestans*)	500 g/200 litros de agua	45 días

***PC= Periodo de Carencia**
GASTO DE AGUA: Cultivo de melón 200 litros/ha. Cultivo de papa 400 litros/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Melón: se aplica 2 veces cada 7 días, al ser un producto preventivo, la aplicación se realizó con los primeros síntomas de la enfermedad en la parcela que para el caso inicial fue del 1% como umbral. **Papa:** se aplica 2 veces cada 7 días en la etapa fenológica de pre-floración con un umbral económico del 2%.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 48 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos Fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos alcalinos o fuertemente oxidantes.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com