FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+DEVACHLOR



REGISTRO NACIONAL: 36-H23/NA

TITULAR: **DUAJA DEL ECUADOR S.A.**

Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Butachlor
Concentración	600 g/l
Categoría toxicológica	III Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 litro, Galon, 10L, 200L
Grupo químico	**Butachlor:** Cloroacetanilidas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Herbicida selectivo y sistémico, es absorbido principalmente por los brotes en germinación, y en segundo lugar por las raíces, con la translocación a través de la planta, dando concentraciones más altas en las partes vegetativas que en partes reproductivas. Inhibe la división celular por el bloqueo de síntesis de proteínas

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **DEVACHLOR**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
ARROZ (*Oryza sativa*)	**MALEZAS PASTO DENTADO** (*Echinochloa crusgalli*) **MONTEBRETIA** (*Crocosmia x crocosmiiflora*) **GARRAPATILLA** (*Peperomia pellucida*)	**1.50 l/ha**	**N/A**

*Volumen de agua: **200 litros de agua/ha.** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se realiza una sola aplicación cuando las malezas presentan un umbral económico de 4-6 cm de altura en estado de pos-emergencia.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos Fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros Herbicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla. No mezclar con fertilizantes, insecticidas y fungicidas.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com