FICHA TÉCNICA

+FELIFULL 72

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: **58-F29/NA**

TITULAR: NGC CROPSCIENCES ECUADOR S.A.S.



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Polvo Mojable (WP)
Ingrediente activo	Cymoxanil + Mancozeb
Concentración	80 g/kg + 640 g/kg
Categoría toxicológica	III Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 Kg
Grupo químico	Difeconazole | Propiconazole: Triazoles

MODO DE ACCIÓN

Cymoxanil inhibe la síntesis de proteínas en los hongos, mientras que el Mancozeb actúa como un fungicida de contacto, formando una capa protectora en las plantas y también inhibiendo enzimas cruciales para el crecimiento del hongo.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del fungicida **FELIFULL 72** en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de preparación. Coloque el envase del pesticida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el pesticida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene pesticidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Papa (*Solanum tuberosum*)	Lancha tardía (*Phythophthora infestans*)	0.50 kg/ha	7 días

*Volumen de agua: **considera un gasto de agua de 200 litros por hectárea.**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar por aspersión a las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje, de acuerdo a la dosis establecida, en fase fenológica de desarrollo vegetativo como plaguicida sistémico y de contacto. Realizar 2 aplicaciones del fungicida con intervalos de 7 días. Periodo de reingreso: Se debe esperar por lo menos 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Puede mezclarse con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes existentes en el mercado, excepto aquellos con reacción fuertemente alcalina.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com