FICHA TÉCNICA

+FELITODIM 240

HERBICIDAS

REGISTRO NACIONAL: 64-H15/NA
TITULAR: NGC CROPSCIENCES ECUADOR S.A.S.



Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Clethodim
Concentración	240 g/L
Categoría toxicológica	II Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	Ciclohexanodionas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

FELITODIM 240 es un herbicida sistémico, se absorbe rápidamente y se traslada fácilmente del follaje tratado al sistema radicular y las partes en crecimiento de la planta. Inhibidor de la síntesis de ácidos grasos, por inhibición del acetil CoA carboxilasa (ACCase).

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del herbicida **FELITODIM 240** en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de preparación. Coloque el envase del pesticida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el pesticida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene pesticidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Soya (*Glycine max*)	**Pata de Gallina** (*Eleusine indica*)	1 L/ha	60 días
Frejol (*Phaseolus vulgaris*)	**Pata de Gallina** (*Eleusine indica*)	0,4L/ha	65 días

***Volumen de agua promedio utilizado para la aplicación: 292 l/ha.**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Soya y fréjol: Aplicar **FELITODIM 240** por aspersión a las malezas cubriendo en forma homogénea todo el follaje en fase fenológica de desarrollo vegetativo y como post emergente de malezas como producto sistémico. Aplicar por una sola ocasión.

FITOTOXICIDAD

FELITODIM 240 no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

PERÍODO DE REINGRESO

Se debe esperar 24 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

COMPATIBILIDAD

Puede mezclarse con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes existentes en el mercado, excepto aquellos con reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com