FICHA TÉCNICA

FENDIMAXX



REGISTRO NACIONAL: 152-F9/NA-CL4
TITULAR: LION AGREVO (JIANGSU) CO., LTD

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Fenpropidin
Concentración	750 g/l
Categoría toxicológica	4 LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1L
Grupo químico	Piperidinas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

FENDIMAXX es un fungicida foliar sistémico con actividad protectora, curativa y erradicadora, con translocación acropétala en el xilema, cuyo mecanismo de acción Inhibidor de la biosíntesis de ergosterol, por inhibición de la reducción de esteroides (esterol- Δ 14-reductasa) y la isomerización (Δ8 a Δ7-isomerasa).

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla el pH del agua debe ser (6.5) y posteriormente regular el pH (5.0) y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite dejar sobrantes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC*
BANANO (*Musa acuminata AAA*)	**SIGATOKA NEGRA** (*Mycosphaerella fijiensis*)	0.60 l/ha	0 días

***Volumen de agua:** 40 litros/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicarse por 2 ocasiones con un intervalo de 7 días en el cultivo de banano en plantas jóvenes antes de floración (menos de 1 año).

PERÍODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 4 horas para reingresar al área tratada en el cultivo de banano.

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con materiales alcalinos fuertes (pH > 11) y ácidos (pH < 3).

FUNGICIDA

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com