FICHA TÉCNICA

+FENPROMAXX

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: **97-F10/NA-CL-2024-0223**

TITULAR: **LIONCHEM-LIFESCIENCE S.A.**



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Líquido Miscible en Aceite (OL)
Ingrediente activo	Fenpropimorph
Concentración	880 g/l
Categoría toxicológica	4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1 L, 5L y 20L
Grupo químico	Morfolinas

MODO DE ACCIÓN

Es la morfolina más activa para el control de la sigatoka negra. Tiene acción sistémica y de contacto. Inhibe la biosíntesis del ergosterol en dos diferentes DMI's, como son las enzimas esterol reductasa y esterol isomerasa, impidiendo la germinación de esporas del hongo y afectando la permeabilidad de la membrana celular.

MODO DE EMPLEO

1. Vierta la cantidad de aceite agrícola necesario.
2. Agrege emulsificante **PATROL** en proporción del 1% en relación a la cantidad de ceite. (siga agitando)
3. Añada la dosis recomendada de **FENPROMAXX**. (siga agitando)
4. Complete con agua hasta obtener 5 gls de mezcla.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Banano (*Musa acuminata* AAA)	**Sigatoka negra** (*Mycosphaerella fijiensis*)	1.0 l/ha	0 días

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Seguir recomendaciones FRAC. Se recomenda aplicar la mezcla de tanque inmediatamente despues de su preparacion.

PERÍODO DE REINGRESO

Se debe esperar 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes Es miscible cpn fungicidas, insecticidas de uso común.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com