+ FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+FUROKILL®



REGISTRO NACIONAL: 39-H99/NA
TITULAR: ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Fenoxaprop Ethyl
Concentración	69 g/l
Categoría toxicológica	III
Cultivos	Arroz
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Ácido fenoxiacético

MODO DE ACCIÓN

FUROKILL® es un herbicida selectivo con contacto y acción sistémica, absorbido principalmente por las hojas, con translocación tanto acropetalmente y basipetalmente a las raíces o rizomas.

MODO DE EMPLEO

Vierta en el tanque de mezcla la cantidad de **FUROKILL®** a utilizar en la mitad de volumen de agua a usar. Agragar a esta mezcla la cantidad de agua requerida para completar la suspensión a ser aplicada; agitar bien y constantemente, verter la mezcla en el tanque de aspersión.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO		CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC PERIODO DE CARENCIA
Arroz (*Oryza sativa*)	**Hoja Angosta**	**Paja de Arroz** (*Echinochloa colonum*) **Barba de indio** (*Echinochloa crus galli*) **Pata de gallina** (*Eleusine indica*) **Buchón** (*Limnocharis llava*) **Pasto ilusión** (*Panicum michloides*) **Guarda Rocio** (*Digitaria sanguinea*) **Paja brava** (*Paspalum paniculatum*) **Pasto bahía** (*Paspalum notatum*)	**2.5 ml/l**	**80 días**
	Cyperáceas	**Coquito púrpura** (*Cyperus rotundus*) **Cortadera** (*Cyperus ferax*) **Coquito amarillo** (*Cyperus esculentus*) **Cortadera acuática** (*Cyperus luzulae*)		
	Hoja Ancha	**Lechosa** (*Euphorbia hirta*), (*Euphorbia hypericifolia*) **Siempre viva** (*Peperomia pellucida*) **Escoba negra** (*Sida rhombifolia*) **Betilla roja** (*Ipomea hederifolia*) **Botoncillo** (*Eclipta alba*) **Mecardonia** (*Mecardonia minuta*)		

400 litros por héctarea

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **FUROKILL®** en post-emergencia temprana cuando el cultivo tenga de 4 hojas verdaderas. se recomienda realizar una aplicación por ciclo de cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un minuto de 12 horas para reingresar al área tratada

FITOTOXICIDAD

El producto **FUROKILL®** no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

FUROKILL® es compatible con la mayoría de plagicidas de uso agrícola, no mezclar con propanil ni con herbicidas hormonales como 4,4 D loxinil y picloram a agente oxidantes fuertes. Se recomoenda realizar pruebas preliminares de compatibilidad a pequeña escala.

Dr. Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com