FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+GLIFOPOWER

REGISTRO NACIONAL:

TITULAR: FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A.

Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Granulos Solubles (SG)
Ingrediente activo	Glyphosate-monoammonium salt
Concentración	757 g/kg
Categoría toxicológica	IV Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 Kg
Grupo químico	Glyphosate: Aminofosfonatos



MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

GLIFOPOWER, formulado a base de GLYPHOSATE-MONOAMMONIUM SALT, es un Herbicida con acción de contacto, sistémica, de amplio espectro, translocada y no residual. Inhibe de EPSP sintasa

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación de la mezcla, verificar el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del herbicida "**GLIFOPOWER**" en la mitad del volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de la aplicación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el herbicida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Tomate rifión (*Lycopersicon esculentum*)	Tizón tardío (*Phytophthora infestans*)	2.0 kg/ha*	3 días
Papa (*So!anum tuberosum*)		0.8 kg/ha**	21 días

*Volumen de agua: **300 l/ha*; 4001/ha**** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Tomate Riñón: Realizar 2 aplicaciones cada 7 días, cuando el cultivo presenta los primeros estadios de la plaga (cuando el umbral económico sea del 2% del área foliar) cuando el cultivo se encuentra en estado fenológico de desarrollo foliar. Papa: Realizar 2 aplicaciones cada 7 días, cuando el cultivo presente los primeros estadios de la plaga (cuando el umbral económico oscile entre 3 - 11.5% de severidad) cuando el cultivo se encuentre en estado fenológico de desarrollo foliar.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar 48 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Puede mezclarse con la mayoría de los agroquímicos y productos fertilizantes existentes en el mercado, excepto aquellos con reacción fuertemente alcalina.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com