
FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+GLYPHOBEX 757

REGISTRO NACIONAL: **232- H1/ NA**

TITULAR: **FELIZ CAMPESINO FELCAMPESINO S.A.**



Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Granulos Solubles (SG)
Ingrediente activo	Glyphosate-monoammonium salt
Concentración	757 g/kg
Categoría toxicológica	IV Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 Kg
Grupo químico	Glyphosate: Aminofosfonatos

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

GLYPHOBEX 757, formulado a base de GLYPHOSATE-MONOAMMONIUM SALT, es un Herbicida con acción de contacto, sistémica, de amplio espectro, translocada y no residual. Inhibe de EPSP sintasa.

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación de la mezcla, verificar el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del herbicida "**GLYPHOBEX 757**" en la mitad del volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Es importante agitar la mezcla antes de cada aplicación. No guardé la mezcla, apliqué el mismo día de la aplicación. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el herbicida con cuidado para evitar derrames o desprendimiento. No mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Banano (*Musa acuminata AAA*)	Justicia (Justicia laevilinguis) Pasto bahía(Paspalum notatum) Pasto ilusión (Panicum trichoides) Rábano silvestre (Raphanus raphanistrum) Lechosa (Euphorbia nutans) Caminadora (Rottboellia cochinchinensis) Drimaria (Drymaria cordata)	1.0 kg/ha*	30 días

*Volumen de agua: **Se considera un gasto de 200 l/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación de plaguicida, por dispersión al suelo, cubriendo en forma homogénea en fase fenológica de desarrollo foliar de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar 48 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: No lo mezcle con compuestos alcalinos.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com