FICHA TÉCNICA

+JARUCO

FUNGICIDA



REGISTRO NACIONAL: 148-F 5/NA

TITULAR: NIMELEC S.A.

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Difeconazole + Propiconazole
Concentración	240 g/l + 250 g/l
Categoría toxicológica	IV Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 litro, 500ml. 250ml
Grupo químico	**Difeconazole | Propiconazole:** Triazoles

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

JARUCO es un fungicida de acción sistémica y por contacto. Su mecanismo se basa en la acción conjunta de sus ingredientes activos: Difenoconazole. Interrumpe la función de la membrana: inhibición de la desmetilación durante la síntesis de ergosterol. Propiconazole. Inhibe la desmetilación de C-14 durante la biosíntesis de ergoster

MODO DE EMPLEO

Aplique **JARUCO** solo mediante aplicación terrestre por aspersión foliar, utilizar el volumen de mezcla de 50 l/ha. A p lica r con un pulverizador manual de mochila con capacidad de 25 1 a una potencia de (0.5 - 3.5 Mpa) y un volumen de descarga de 4.8l/min, se recomienda el uso de boquillas de tipo cono hueco. Se debe de realizar previamente la calibración de los equipos de aplicación. Se seguirán los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada. Para la aplicación del producto se debe de realizar la mezcla en un recipiente de menor tamaño con agua, aplicar la dosis requerida de Jaruco. agitar hasta formar una mezcla uniforme; acto seguido completar con el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar, usando el equipo completo de protección. Antes de la aplicación, calibrar el equipo para determinar el volumen de mezcla a utilizar

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Banano (*Musa acuminata*)	**SIGATOKA NEGRA** (*Mycosphaerella fijensis*)	0.30 l/ha	0 días

LMRs: **Banano (*Musa acuminata*). Difenoconazole 0.1 mg/kg. Propiconazole 0.1 mg/kg.** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplique las dosis recomendadas de **JARUCO** siguiendo las directrices de las Buenas Prácticas Agrícolas. **Banano (*Musa acuminata*):** Realizar como máximo 2 aplicaciones del producto formulado **JARUCO** por ciclo vegetativo, con un intervalo de 7 días entre ellas, cuando el cultivo del banano se encuentre en la fase de producción.

PERIODO DE REINGRESO

48 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes debe utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD

JARUCO no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD

JARUCO No compatible con materiales corrosivos y de pH extremos (ácidos fuertes y bases fuertes), menores de 3 y mayores de 10.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com