FICHA TÉCNICA

+KONRAD

FUNGICIDA



REGISTRO NACIONAL: 143-F13/NA
TITULAR: DUAJA DEL ECUADOR S.A

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Azoxystrobin + Difenoconazole
Concentración	200 g/l + 125 g/l
Categoría toxicológica	IV Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 litro, 250ml, 125ml
Grupo químico	**Azoxystrobin:** Estrobilurina **Difenoconazole:** Triazoles

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

KONRAD, es un fungicida compuesto por Azoxystrobin que Inhibe la respiración mitocondrial bloqueando la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c1, en el sitio de oxidación del ubiquinol. Controla las cepas patógenas resistentes a los inhibidores de la 14-desmetilasa, las fenilamidas, las dicarboxamidas o los bencimidazoles y por Difenoconazole que inhibe la desmetilación de esteroles. Inhibe la biosíntesis de ergosterol de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, verificar y regular el pH del agua hasta obtener un pH de 5.5, vierta la dosis recomendada del fungicida **KONRAD** en la mitad de volumen requerido de agua, mezcle lentamente y añada la cantidad de agua restante hasta completar el volumen total. Coloque el envase del plaguicida en una superficie plana y ábralo con cuidado. Vierta el plaguicida con cuidado para evitar que se derrame. Nunca mezcle, cargue o limpie el equipo cerca de estanques, arroyos, pozos o zanjas, ya que el agua de enjuague que contiene plaguicidas puede rebozarse y derramarse entre estas fuentes de agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Arroz (*Oryza sativa*)	Control de Quemazón o Añublo (*Pyricularia oryzae*)	0.50 L/ha*	45 días

*Volumen de agua: **400 l/ha** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar por aspersión en fase fenológica de floración como plaguicida sistémico y de contacto. Realizar 2 aplicaciones del plaguicida con intervalos de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 48 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

No compatible con Ácidos fuertes, álcalis fuertes y agentes oxidantes fuertes.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com