FICHA TÉCNICA


+LAMPO

INSECTICIDA

REGISTRO NACIONAL: 80-I33/NA

TITULAR: PROQUIMUR S.A

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Cebo de Aplicación Directa (RB)
Ingrediente activo	Fipronil
Concentración	0.03 g/kg
Categoría toxicológica	4 - LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1 Kg
Grupo químico	Fenilpirazoles



MODO DE ACCIÓN

Insecticida formicida de amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión. Moderadamente sistémico. Insecticida bioquímico que actúa como un potente bloqueador del canal de cloruro regulado por GABA. Los insectos resistentes o tolerantes a insecticidas piretroides, ciclodieno, organofosforados y/o carbamatos son susceptibles al fipronil.

MODO DE EMPLEO

La aplicación se realiza directamente al suelo, al ser un cebo en gránulos, es necesario que se encuentre cerca de los hormigueros. Cubriendo el perímetro de la entrada del hormiguero a un metro de distancia.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS*	*PC
Cacao (*Theobroma cacao*)	**Hormiga Arriera** (*Atta cephalotes*)	10 g/m²	No Aplica

(*): 10 g de hormiguicida LAMPO por metro cuadrado de suelo removido por hormigas.
Volumen de agua: No requiere agua. ***PC: Período de Carencia**

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

El producto debe aplicarse en una sola ocasión. Coloque el cebo cuando observe hojas comidas en forma de media luna y restos acumulados al pie de la planta.

PERÍODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com