FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA

+LUBE



REGISTRO NACIONAL: 195-I11/NA

TITULAR: DR. AGRO S.A. DORAGRO

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Lufenuron + Emamectin Benzoate
Concentración	90 g/l + 20 g/l
Categoría toxicológica	IV-CUIDADO
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	**Lufenuron** Benzoylurea **Emamectin Benzoate** Avermectinas

MODO DE ACCIÓN

LUBE: Lufenuron es un regulador de crecimiento de los insectos, que interfiere con la síntesis de la quitina, inhibiendo el crecimiento de larvas (especialmente de lepidópteros y de coleópteros), actúa por ingestión y tiene efecto ovicida. EL Benzoato de Emamectina actúa bloqueando las se señales nerviosasde las larvas, que dejan de alimentarse, se paralizan irreversiblemente y luego de un máximo de 4 días mueren. Muestra además una excelente selectividad hacia los insectos benéficos, ya que no afectan a los adultos y tienen una débil acción de contacto.

MODO DE EMPLEO

Aplicado sobre el follaje actúa por contacto, ingestión e inhalación. Para evitar la generación de resistencia, se recomienda rotar con insecticidas con diferentemodo de acción sobre la plaga a controlar.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	*PC
PALMA AFRICANA (*Eleasis guineensis*)	**DEFOLIADOR** (*Sibine* sp) **MINADOR** (*Scrobipalpula osides*) **BARRENADOR** (*Humalinotus* sp)	1.0 l/ha	En invierno mínimo una aplicación en verano y mínimo 2 aplicaciones con una frecuencia de 30 días
MAÍZ (*Zea Mays*)	**DEFOLIADOR** (*Spodoptera frugiperda*)	0.3 - 0.4 l/ha	Hacer las aplicaciones al aparecimiento de las primeras larvas sobre el follaje a una frecuencia de 10 a 15 días
TOMATE RIÑON (*Lycopersiconesculentum*)	**POLILLA DEL TOMATE** (*Tuta Absoluta*)	0.1 l/200 litros	

***PC: Período de Carencia**

PERÍODO DE CARENCIA

Palma Africana no aplica, Maíz 15 días, Tomate y Hortalizas de 3 a 4 días.

PERÍODO DE REINGRESO

Dos horas después que se haya secado la pulverización.

COMPATIBILIDAD

El producto es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. Se recomienda hacer pruebas previas cuando se va a mezclar el producto con concentrados emulsionables. para una mayor cobertura añadir dispensante.

Dr. Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com