FICHA TÉCNICA

+LUCRO

INSECTICIDA

REGISTRO NACIONAL: 117-I 7/NA-CL1
TITULAR: ROTAM ECUADOR S.A.



Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Bifenthrin
Concentración	100 g/l
Categoría toxicológica	II Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	Bifenthrin Piretroides

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

LUCRO es un insecticida piretroide sintético utilizado para controlar diversos insectos en entornos agrícolas y residenciales. Su modo de acción se centra en afectar el sistema nervioso de los insectos al interferir con los canales de sodio en las membranas celulares, lo que conduce a hiperexcitación nerviosa, parálisis y eventual muerte del insecto. Su persistencia proporciona un control prolongado, pero es esencial seguir las instrucciones de la etiqueta para un uso adecuado y seguro, teniendo en cuenta las regulaciones locales para minimizar impactos ambientales y riesgos para la salud.

MODO DE EMPLEO

Para preparar la dilución del producto, mezclar en un recipiente que contenga las tres cuartas partes de agua y añadir la dosis recomendada de **LUCRO**, agitar fuertemente hasta que la solución sea homogénea. En el tanque de mezcla añadir esta dilución y completar el volumen de agua necesario para la aplicación; agitar bien y constantemente. No guardar la mezcla preparada, usarla de inmediato. Es recomendable regular pH y dureza, continuar con la agitación hasta obtener una mezcla homogénea.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Papa (*Solanum tuberosum*)	**GUSANO BLANCO** (*Premnotrypes vorax*)	0.5*	35 días
	PARATRIOZA (*Bactericera cockerelli*)	0.2**	7 días

*Gasto de agua l/ha: ***500, ****400** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Dependiendo de la variedad del cultivo, realizar 3 aplicaciones: a los 30 días (deshierba), 60 días (aporque) y 90 días (maduración fisiológica). Aplicar en la base de la planta y el follaje. Paratrioza: realizar una aplicación foliar en presencia de 2 ninfas/planta.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico a la dosis y usos recomendados.

COMPATIBILIDAD

No se observó alguna incompatibilidad pero se recomienda evitar mezclar con químicos altamente reactivos como ácidos fuertes, bases fuertes o agentes oxidantes fuertes.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com