FICHA TÉCNICA

+PICANTO

FUNGICIDA



REGISTRO NACIONAL: 67-F22/NA-CL-2025-0078

TITULAR: NGC CROPSCIENC· ES ECUADOR S.A.S.

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Difenoconazole
Concentración	250 g/l
Categoría toxicológica	II - Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	Difeconazole: Triazoles

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

PICANTO es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Absorbido por las hojas, con translocación acropetal y fuerte translaminación. Inhibidor de la desmetilación de esteroles. Inhibe la biosíntesis de ergosterol de la membraba celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

MODO DE EMPLEO

Usar el equipo de protección adecuado (guantes, botas, mascarilla, overol, gorra, lentes protectores). En un recipiente con agua adicionar la dosis necesaria del producto a probar para cubrir el área de cada tratamiento. Agitar la mezcla durante cinco minutos. Verificar y regular el pH de la mezcla adecuado para el efecto (pH 5.5). Agregar agua a la bomba de mochila. Colocar la mezcla del producto en la bomba y completar con agua la cantidad necesaria.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Banano (*Musa acuminata* AAA)	Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*)	20.0 ml/l ó 0.40 l/ha*	7 días
Pitahaya (*Hylocereus* spp.)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	0.25 l/ha**	7 días

Volumen agua: **Banano*** En aplicación Aérea se considera un gasto de agua de 20 litros de agua por hectárea. En aplicación Terrestre se considera un gasto de agua de 100 litros por hectárea. **Pitahaya**** 250 l//ha.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Banano: La aplicación se realizó por aspersión en las partes aéreas de las plantas, cubriendo en forma homogénea todo el follaje en la fase fenológica de desarrollo vegetativo y fructificación. Dentro del ciclo de cultivo se realizó dos aplicaciones con intervalos de 14 días.
Pitahaya: Aplicar en dos ocasiones a intervalos de 7 días en los primeros indicios de presencia de la plaga cuando el cultivo se encuentre en la fase de desarrollo/reproductivo.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con material oxidante fuerte.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com