FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+PLATINA



REGISTRO NACIONAL: 6-H8/NA
TITULAR: **NGC CROPSCIENCES ECUADOR S.A.S**

Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Ingrediente activo	MCPA
Concentración	480 g/l
Categoría toxicológica	IV Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	MCPA: Ácidos Fenoxi

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

PLATINA es un herbicida selectivo, sistémico, tipo hormonal, absorbido por las hojas y raíces, con translocación. Se concentra en las regiones meristemáticas, donde inhibe el crecimiento.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque de la pulverizad ora hasta la mitad de su capacidad y agregar el agroquímico evitando derrames o salpicaduras. Poner en marcha el agitador del equipo o agitar manualmente con un objeto que no elimine el contacto directo con manos y que permita una buena homogeneidad del producto en el total de agua disuelto. Completar el llenado del equipo con agua, sin dejar de agitar.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Arroz (*Oryza sativa*)	**BOTONCILLO** (*Eclipta alba*) **CLAVO DE AGUA** (*Jussiaea linifolia*)	0.5 l/ha	15 días

*Volumen de agua: **250 l/ha.*** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar en una sola ocasión, cuando el cultivo se encuentre en estado de desarrollo, donde las malezas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar 48 horas para reingreso al área tratada en caso necesario de hacerlo.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes que existen en el mercado, excepto los de reacción fuerte alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com