FICHA TÉCNICA

+PQM MAMUT

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: **295-F2/NA**

TITULAR: PROQUIMUR S.A



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Propamocarb hydrochloride + Fluopicolide
Concentración	625 g/L + 62,5 g/L
Categoría toxicológica	4 Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	Propamocarb hydrochloride: Carbamatos Fluopicolide: Carboxilamidas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Propamocarb hydrochloride es un fungicida sistémico con acción protectora. Absorbido por las raíces y hojas, y transportado acropetalamente. Actúa reduciendo el crecimiento micelial y el desarrollo de esporangios y esporas (Z00) e influye en la síntesis bioquímica de membranas. **Fluopicolide** es un fungicida mesosistémico; se traslada hacia las puntas del tallo a través del xilema, pero no hacia las raíces. Deslocaliza las proteínas similares a la espectrina.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, regular pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite dejar sobrantes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
PAPA (*Solanum tuberosum*)	**Tizón Tardío** (*Phytophthora infestans*)	**1.5 l/ha**	**14 días**

*Volumen de agua: **400 litros/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El producto debe aplicarse en el cultivo de PAPA, en crecimiento vegetativo, debe aplicarse por dos ocasiones en un intervalo de 7 días.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas.

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de aquellos de reacción fuertemente ácida o alcalina y agentes oxidantes fuertes. Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá realizar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com