FICHA TÉCNICA

+PQM TRILER

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL:**195-F6/NA**

TITULAR: PROQUIMUR S.A



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Tebuconazole + Trifloxystrobin
Concentración	200 g/L + 100 g/L
Categoría toxicológica	4 Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 litro
Grupo químico	Tebuconazole: Triazoles Trifloxystrobin: Estrobilurina

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Tebuconazole es un fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante. Se absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con translocación principalmente acropetal. Inhibidor de la desmetilación de esteroides (biosíntesis de ergosterol). **Trifloxystrobin** es un fungicida mesosistémico de amplio espectro con actividad preventiva y curativa específica y de resistencia a la lluvia. Se redistribuye por el movimiento superficial del vapor y también tiene actividad translaminar. Inhibe la respiración mitocondrial al bloquear la transferencia de electrones en el centro Qo del citocromo bc1.

MODO DE EMPLEO

Previo a la preparación de la mezcla, regular pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite dejar sobrantes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
ARROZ (*Orysa sativa*)	**Pudrición de la vaina** (*Sarocladium oryzae*)	**0.6 l/ha**	**35 días**

*Volumen de agua: **250 litros/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El producto debe aplicarse en el cultivo de ARROZ, en crecimiento vegetativo, por 2 ocasiones con un intervalo de 7 dias.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 24 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

COMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con fuertes agentes oxidantes. Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com