FICHA TÉCNICA

+PRISEFEN

INSECTICIDA



REGISTRO NACIONAL: 110-I11/NA-CL-2023-0070
TITULAR: SINOCHEMICAL S.A.

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Pyriproxyfen
Concentración	100 g/l
Categoría toxicológica	4 LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	1L
Grupo químico	Éteres piridiloxifenil

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

PRISEFEN es un insecticida de amplio espectro, imita la hormona de crecimiento juvenil de insectos, deteniendo el desarrollo durante la metamorfosis y el desarrollo larvario.

MODO DE EMPLEO

Para su preparación colocar en un recipiente adecuado para el efecto, aplicar la dosis recomendada, agitar hasta formar una mezcla uniforme, completar el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y aplicar utilizando el equipo completo de protección. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Banano (*Musa acuminata* AAA)	**Mosca blanca** (*Aleurothrixus floccosus*)	0.40 l/ha	14 días
Papa (*Solanum tuberosum* L.)	**Paratrioza** (*Bactericera cockerelli*)	0.25 l/ha	7 días
Rosa (*Rosa* sp.)	**Trips** (*Frankliniella occidentalis*)	0.50 l/ha	No aplica

Volumen de agua: 80 l/ha banano, 600 l/ha papa, 1100 l/ha rosas. ***PC.:** Período de carencia.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación por ciclo de cultivo. Banano. Aplicar el producto cuando aparezcan 4 insectos por 10 hojas de plantas. Papa: Aplicar el producto cuando aparezcan 2 insectos por hoja en el cultivo de papa. Rosas: Aplicar el producto cuando aparezcan 2 insectos por 10 botones florales en el cultivo de rosas. Rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar resistencia de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com