HERBICIDAS

+ FICHA TÉCNICA

+QUILO® 170



REGISTRO NACIONAL: 206 - H2/NA

TITULAR: LIONCHEM-LIFESCIENCE S.A.

Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Dispersión en Aceite (OD)
Ingrediente activo	Quinclorac + Cyhalofop-butyl
Concentración	100 g/l | 70 g/l
Categoría toxicológica	IV
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	**Quinclorac Ácido** Quinolinecarboxilico **Cyhalofop-butyl** Ariloxifenoxipropiónico

MODO DE ACCIÓN

QUILO® 170 es absorbido a través del follaje, herbicida de postemergencia con absorción foliar solamente y sin actividad del suelo, herbicida sistémico que es fácilmente absorbido por el tejido vegetal, tiene una movilidad moderada del floema y se acumula en las regiones meristemáticas.
Auxina sintética (que actúa como ácido indolilacético); también inhibidor de la biosíntesis de la pared celular (celulosa). Inhibidor de la síntesis de ácidos grasos, por inhibición del acetil CoA carboxilasa (ACCasa). La selectividad entre gramíneas susceptibles y plantas dicotiledóneas se atribuye a las formas de ACCasa presentes y su compartimentación dentro de las células vegetales.

MODO DE EMPLEO

Realizar la mezcla en un recipiente pequeño con agua, aplicar la dosis requerida de **QUILO® 170** agitar hasta formar una mezcla uniforme; seguido se completa el volumen de agua a usar, colocar en la bomba y se aplica usando el equipo completo de protección. Antes de la aplicación se calibro el equipo para determinar el volumen de mezcla a utilizar

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONTROL DE MALEZAS	DOSIS	PC PERIODO DE CARENCIA
ARROZ (*Oryza sativa*)	**Moco de pavo** (*Echinochloa crusgalli*) **Clavo de agua** (*Ludwigia linifolia*) **Paja blanca** (*Leptochloa scabra*)	2.0 l/ha *	60 días

Volumen de agua: **400 l/ha**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El producto **QUILO® 170** , debe aplicarse en una sola ocasión, cuando el cultivo de arroz se encuentre en Fase de Crecimiento desarrollo vegetativo 20 días después del trasplante.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

QUILO® 170 es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

COMPATIBILIDAD

QUILO® 170 es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com