FICHA TÉCNICA

+SAMAR

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: 143-F13/NA
TITULAR: DUAJA DEL ECUADOR S.A



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo	Bupirimato
Concentración	250 g/l
Categoría toxicológica	IV Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	200 ml
Grupo químico	**Bupirimate:** Dicarboximidas

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico con la acción protectora y curativa. Absorbido por las hojas, con translocación en el xilema y la acción translaminar. Actúa inhibiendo la esporulación. Inhibe la adenosina deaminasa

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **SAMAR**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Rosas (*Rosa* sp.)	**CENICILLA** (*Oidium* sp.)	1 ml/l	N/A

*Volumen de agua: **2000 l/ha** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar dos (2) aplicaciones cada 7 días en el área foliar del cultivo de Rosa establecido. Verificando previamente presencia de plaga.

PERIODO DE REINGRESO

En general, esperar 12 horas después de transcurrida la aplicación para reingresar al área. En caso de reingreso usar equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, época y cultivo.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Evitar oscilaciones extremas de temperatura durante su almacenaje.recomendado.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros fungicidas, sin embargo, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación si se requiere hacer la mezcla.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com