FICHA TÉCNICA

+STOPLAGA®

FUNGICIDA



REGISTRO NACIONAL: 212-F4/NA

TITULAR: ACTIVA DISTRIAGROLEAD ECUADOR S.A.

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Suspoemulsión (SE)
Ingrediente activo	Pyraclostrobin 133 g/l + Epoxiconazole 50 g/l
Concentración	133 g/l + 50 g/l
Categoría toxicológica	4 Ligeramente Peligroso
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Pyraclostrobin: Estrobilurina Epoxiconazol: Triazol

MODO DE ACCIÓN

STOPLAGA® es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, compuesto por dos ingredientes activos: **Pyraclostrobin:** Inhibe la respiración mitocondrial al bloquear la transferencia de electrones en el complejo citocromo bc1. **Epoxiconazole:** Esterol inhibidor de desmetilación. Inhibe la biosíntesis de ergosterol de la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo.

MODO DE EMPLEO

Para preparar la mezcla, se recomienda agregar la cantidad requerida de **STOPLAGA®** directamente al tanque conteniendo agua hasta la mitad y en movimiento constante, hasta formar una mezcla homogénea.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
MAÍZ (*Zea mays*)	**Mancha del asfalto** (*Phyllachora maydis*)	0,75 l/ha	30 días

*Volumen de agua: **400-500 l/ha** *PC: **Período de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

La aplicación de **STOPLAGA®** La dosis y la frecuencia de aplicación pueden variar. Por ejemplo, en cultivos como cereales, la aplicación puede realizarse una o dos veces por temporada de crecimiento, dependiendo de la presión de la enfermedad y las recomendaciones específicas de la etiqueta. En cultivos con ciclos más largos o en regiones con alta presión de enfermedades, podrían recomendarse aplicaciones adicionales.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

STOPLAGA® no es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

STOPLAGA® es miscible con el fertilizante foliares, cada producto dede añadirse de forma separada al tanque de aspersión. Así también es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso corriente; no se debe mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de duda hacer prueba a pequeña escala.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com