
FICHA TÉCNICA

HERBICIDAS

+TOROCIE TOP

REGISTRO NACIONAL: 127 H4/NA
TITULAR: SINOCHEMICAL S.A.



Tipo de producto	Herbicida Agrícola
Formulación	Solución Líquida (SL)
Ingrediente activo	2,4 D Amina + Aminopyralid
Concentración	320 g/l + 40 g/l
Categoría toxicológica	Categoría Toxicológica IV
Presentaciónes	1L
Grupo químico	2,4 D Amina: Ácidos Fenoxiacéticos Aminopyralid: Ácido Piridin Carbpxílicos

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

TOROCIE TOP® es un herbicida que combina dos principios activos: 2,4-D: sistémico selectivo. Las sales son fácilmente absorbidas por las raíces, mientras que los ésteres son fácilmente absorbidos por el follaje. Ocurre translocación, con acumulación principalmente en las regiones meristemáticas de brotes y raíces. Actúa como inhibidor del crecimiento. Auxina sintética (que actúa como ácido indolilacético). Aminopyralid: Acción sistémica, post-emergencia, absorbida por hojas y raíces, alguna acción residual.

MODO DE EMPLEO

Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de TOROCIE TOP en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
Pasto Saboya (*Panicum maximum Jacq*)	**Dormidera** (*Mimosa pudica*) **Frijolillo** (*Sena obtusifolia*) **Lengueta** (*Hybanthus attenuatus*) **Betilla purpura** (*Ipomoea fistulosa*) **Malva** (*Melochia pyramidata*) **Betilla blanca** (*Ipomoea quinquefolia* L.)	3 l/ha	No Aplica

*Volumen de agua: 200 l/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben realizarse sobre malezas expuestas que se encuentren en estado de desarrollo vegetativo, antes de su floración. No aplicar sobre maleza que haya sufrido estrés por falta de humedad o por alguna otra causa. Si se tiene que hacer más de una aplicación, dejar entre 30 a 45 días entre una y otra.

PERIODO DE REINGRESO

48 horas después de la aplicación

FITOTOXICIDAD

TOROCIE TOP® no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

TOROCIE TOP® Incompatible con álcalis y ácidos fuertes. En caso de requerirse mezcla con otros productos, bajo responsabilidad del usuario, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

Dr.Agro
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com