FICHA TÉCNICA

+VERDUN

FUNGICIDA

REGISTRO NACIONAL: 13-F8/NA-CL1

TITULAR: DUAJA DEL ECUADOR S.A



Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Polvo Mojable (WP)
Ingrediente activo	Fosetyl Aluminium
Concentración	800 g/kg
Categoría toxicológica	III - LIGERAMENTE PELIGROSO
Presentaciónes	500 gr
Grupo químico	Fosetyl Aluminium: Fosfonatos

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

VERDUN actúa como fungicida al inhibir la síntesis de fosfato en hongos patógenos. Después de la absorción por las hojas y raíces de las plantas, se convierte en fosfonato, interfiriendo con la fosforilación en los hongos, lo que afecta la formación de esporas y ralentiza su crecimiento. Con actividad sistémica, se desplaza dentro de la planta, protegiendo áreas no tratadas directamente. Además, estimula la resistencia de la planta, activando mecanismos de defensa sistémica adquirida. Su aplicación preventiva es crucial, y el cumplimiento de las pautas de uso y regulaciones locales garantiza su eficacia y seguridad.

MODO DE EMPLEO

Las aplicaciones fueron dirigidas al botón floral de la planta con el fin de obtener control sobre el blanco biológico. Se mantuvo la mezcla en constante agitación y se aplicó procurando cubrir total y uniformemente el botón floral de las plantas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS*	PC*
ROSAS (*Rosa* sp.)	**Mildiu Velloso** (*Peronospora sparsa*)	2.6 kg/ha	No aplica
TOMATE RIÑÓN (*Lycopersicum esculentum Mill*)	**Tizón tardío** (*Phytophthora infestans*)	2.50 kg/ha	3 días

*Volumen de agua: **1300 litros de agua por hectárea; Tomate riñón 200 l/ha** *PC: **Periodo de carencia**

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

ROSA: 2 Aplicaciones con una frecuencia de 7 días cuando presente síntomas de la plaga. **TOMATE RIÑÓN:** Realizar 2 aplicaciones en presencia con una frecuencia de 7 días de los primeros síntomas de la plaga cuando el cultivo se encuentre en estado fenológico de desarrollo vegetativo / reproductivo.

PERIODO DE REINGRESO

12 horas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, época y cultivo recomendado.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezclas con fertilizantes y otros agroquímicos se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

Dr.Agro

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Via. Samborondón, frente al Parque Histórico.
Samborondón, Guayas. Ecuador.
Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com