FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA

+XANDA®



REGISTRO NACIONAL: 123-I22/NA
TITULAR: DUAJA DEL ECUADOR S.A.

Tipo de producto	Insecticida Agrícola
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo	Lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxam
Concentración	106 g/l + 141 g/l
Categoría toxicológica	3 Moderadamente Peligroso
Presentaciónes	1 L
Grupo químico	Lambda-Cyhalothrin Piretroides Sintéticos Thiamethoxam Neonicotinoides

MODO DE ACCIÓN

Lambda Cyhalothrin actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, perturba la función de las neuronas por interacción con el canal de sodio. Thiamethoxam agonista del receptor nicotínico de acetilcolina, que afecta las sinapsis en el sistema nervioso central de los insectos

MODO DE EMPLEO

Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de XANDA, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Aplique en las partes aérea mojando toda el área foliar. Aplicar en las primeras horas de la mañana en presencia de la plaga.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC*
Tomate Riñón (*Lycopersicon esculentum*)	**Mosca Blanca** (*Trialeurodes vaporariorum*)	300 cc/ha	8 días

*PC= Periodo de carencia
Volumen de agua: 200 l/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar una (1) sola aplicación al follaje del cultivo de Tomate Riñón establecido, en la etapa fenológica de crecimiento reproductivo, verificando previamente la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 48 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD

El producto cuando es aplicado en la dosis recomendada y de acuerdo a lo indicado en la etiqueta no produce efectos fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros insecticidas, sin embargo es recomendable hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

Dr.Agro
Montalvo. vía Flores km 1.5 vía
Babahoyo - Balzapampa
05 2 953 325
admi@dragrosa.com

www.dragrosa.com